
東海大学大学院医学研究科

教員紹介

領域(医学部組織) 脳神経内科学

専門分野キーワード



取得学位 現在の身分 (役職名) 専門分野 現在の研究課題

教員氏名

所属学会

永田 栄一郎 (ながた えいいちろう) 博士 (医学)

東海大学医学部内科学系脳神経内科 領域主任・教授

神経内科、神経科学、片頭痛、免疫性神経疾患、神経変性疾患

- 1) 生体内におけるイノシトール・ポリリン酸の役割
- 2) 片頭痛病態生理の解明
- 3) 脳血管障害における再生アソシエイト細胞の研究

日本神経学会(専門医、指導医、代議員、頭痛診療ガイドライン作成委員会研究協力者、頭痛セクションコアメンバー)、日本内科学会(認定医、指導医)、日本脳卒中学会(専門医、指導医、幹事)、日本脳循環代謝学会(理事)、日本頭痛学会(専門医、指導医、理事、教育関連委員、専門医委員、国際頭痛分類委員、選挙管理委員、ガイドライン委員、編集委員長)、日本神経治療学会(評議員)、日本神経科学会、日本神経化学会(評議員)、日本脳血管・認知症学会(理事)、Society for Neuroscience、New York Academy of Science、International Headache

Neuroscience, New York Academy of Science, International Headache Society, International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism

研究内容:

1) 生体内におけるイノシトール・ポリリン酸の役割

イノシトール 6 リン酸(InsP6)は生体内では、InsP3 よりも量が多く、イノシトールリン酸の中でも一番量が多く存在している (哺乳類、植物界を含めて)。また、特に脳内に多く発現している。しかし、このような事実は意外に知られておらず、InsP6 及びイノシトール 7 リン酸(InsP7)においては、その機能については全く明らかにされていないと言っても過言でない。近年、我々は InsP7 が細胞死を誘導するということを発見した。その際に InsP6 を InsP7 にリン酸化するイノシトール 6 リン酸(InsP6)キナーゼ(InsP6K)が活性化されて InsP7 が増加するものと考えられる。(Nagata E ら、J Biol Chem, 2005) 中でも IP6K のサブタイプ (InsP6K1,2,3)のうち、InsP6K2 がアポトーシスと深く関連していることが明らかとなった。この InsP6K は特に神経細胞に多く分布しており、現在、我々は、神経変性疾患と InsP6K との関連について研究を進めている。

2) 片頭痛病態生理の解明

器質的疾患に伴わない、いわゆる機能性頭痛の代表である片頭痛は、患者の数が比較的多いにもかかわらず 致命的な疾患でないこと、及び動物などを使用する実験が非常に困難なこともあり、その病態においては未だに明 確なものは示されていない。そこで、我々は片頭痛病態モデルとしてヒト・リンパ芽球が利用できることを報告した。ま た、近年、一部の片頭痛患者においてビタミンD結合タンパク質の異常が存在することも明らかとした。そこで、本プロ ジェクトは、実験的アプローチが非常に困難である頭痛、特に片頭痛に焦点をあて、ゲノム、RNA や転写因子やタン パク質をターゲットとするオミックス研究により、分子生物学的に片頭痛病態を明らかとしていく。

主要論文

- Ito M, Fujii N, Kohara S, Hori S, Tanaka M, Wittwer C, Kikuchi K, Ijjima T, Kamimoto Y, Hirabayashi K, Kurotaki D, Jessen HJ, Saiardi A, <u>Nagata E</u>. Inositol pyrophosphate profiling reveals regulatory roles of IP6K2-dependent enhanced IP7 metabolism in the enteric nervous system. J Biol Chem 2023; 299: 102928.
- Ueno Y, Miyamoto N, Hira K, Doijiri R, Yamazaki H, Sonoda K, Koge J, Iwata T, Todo K, Yamagami H, Kimura N, Morimoto M, Kondo D, Okazaki S, Koga M, Nagata E, Hattori N; CRYPTON-ICM investigators. Left atrial appendage flow velocity predicts occult atrial fibrillation in crytogenic stroke: a CRYPTON-ICM registry. J Neurol 2023; 270: 5878-5888.
- 3. Watanabe N, Shinozaki Y, Ogiwara S, Miyagasako R, Sasaki A, Suzuki Y, Kato J, Fukunishi N, Okada Y, Saito T, Iida Y, Higashiseto M, Masuda H, Goto K, Amino M, Tsuji T, Morita S, Nagata E, Nakagawa Y, Hirayama N, Inokuchi S. Diphenyl-tetrazol-propanamide derivatives act as dual-specific antagonists of platelet CLEC-2 and GPVI. Thromb Haemost 2023; 15: doi: 10.1055/a-2211-5202.

- 4. Nagata E, Fujii N, Kohara S, Okada C, Satoh T, Takekoshi S, Takao M, Mihara B, Takizawa S. Inositol hexakisphosphate kinase 2 promotes cell death of anterior horn cells in the spinal cord of patients with amyotrophic lateral sclerosis. Mol Biol Rep 2020; 47: 6479-6485.
- 5. Nagata E, Masuda H, Nakayama T, Netsu S, Yuzawa H, Fujii N, Kohara S, Sorimachi T, Osada T, Imazeki R, Matsumae M, Asahara T, Takizawa S. Insufficient production of IL-10 from M2 macrophages impairs invitro endothelial progenitor cell differentiation in patients with Moyamaya disease. Sci Rep 2019; 9: 16752.

Copyright (C) 2024 東海大学大学院医学研究科. All Rights Reserved.